

Mission:

To protect, promote and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts.



Ron DeSantis
Governor

Joseph A. Ladapo, MD, PhD
State Surgeon General

Vision: To be the **Healthiest State** in the Nation

Agosto 28, 2026

Estimado miembro de la comunidad:

El Departamento de Salud de Florida en el Condado de Collier (DOH-Collier) está trabajando estrechamente con proveedores de atención médica y miembros de la comunidad para identificar y notificar a las personas que puedan haber estado expuestas al sarampión (measles), tras la identificación de tres bebés con sarampión en Immokalee.

Las personas que han tenido sarampión anteriormente o que han recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola (MMR, por sus siglas en inglés) tienen pocas probabilidades de contraer sarampión. El Sarampión es altamente contagioso y hasta el 90% de las personas que no tienen inmunidad pueden contraer la enfermedad si están expuestas.

La vacuna MMR puede administrarse a bebés de 6 a 11 meses de edad cuando existe un mayor riesgo de exposición al sarampión en la comunidad o antes de un viaje internacional. Se recomienda que los niños que reciban una dosis de la vacuna MMR antes de cumplir un año continúen recibiendo las dos dosis de la vacuna MMR correspondiente al esquema de vacunación de rutina.

La vacuna MMR está disponible en consultorios pediátricos o en DOH-Collier (419 North First St, Immokalee, FL. Teléfono: 239-252-7300).

Si su bebé (menor de 12 meses) ha estado expuesto al sarampión, comuníquese con su proveedor de atención médica para considerar las opciones de tratamiento incluyendo la vacuna MMR después de la exposición u otro medicamento (inmunoglobulina) para prevenir el sarampión.

Se recomienda a los residentes estar atentos a los siguientes síntomas en sus familiares:

- Fiebre
- Tos
- Secreción nasal
- Ojos rojos y llorosos
- Posteriormente, una erupción cutánea que generalmente comienza en la cara y el cuello antes de extenderse a otras partes del cuerpo.

Cualquier persona que presente síntomas de sarampión debe permanecer en casa, excepto cuando necesite recibir atención médica, y no debe asistir a eventos o reuniones grupales hasta que se haya recuperado por completo sin medicamentos. **Si sospecha que tiene sarampión o presenta estos síntomas, comuníquese con su proveedor de atención médica antes de acudir a una clínica u hospital para recibir instrucciones sobre como buscar atención medica de manera segura y evitar exponer a otras personas.**

Si alguna persona en su hogar es diagnosticada con sarampión, se considera que todos los miembros del hogar han estado expuestos y se les recomienda estar atentos a la aparición de síntomas.

